



Vacuna **Spikevax** Moderna, Inc.

Es una vacuna de ARN mensajero. La vacuna no tiene capacidad y no puede producir la enfermedad de COVID-19.



Seguridad en combinaciones de vacunas

La aplicación de vacunas diferentes por elección propia debe evitarse. De acuerdo con los estudios clínicos disponibles y la recomendación del grupo asesor de expertos en vacunación la combinación de vacunas puede realizarse solo con vacunas autorizadas y de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Vacunación contra SARS-CoV-2.

Eficacia

La vacuna tiene Eficacia del 94.1% en la prevención de casos de COVID-19 y contra las formas graves del 90.9%, incluidas las personas con enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca y/o hepática, obesidad, diabetes mellitus o infección por VIH.

Dosis, vía y sitio de administración

Moderna puede ser aplicada a personas a partir de los 18 años de edad en esquema de vacunación primario o de refuerzo la dosis es de 0.5 mL aplicadas por vía intramuscular en el músculo deltoides del brazo de menor uso.

La dosis de refuerzo contra COVID-19 se puede recibir si han pasado al menos 6 meses después de haber recibido las dosis del esquema de vacunación principal con cualquier vacuna contra la COVID-19.

Efectos Adversos

Los efectos adversos reportados, son en su mayoría leves a moderados, los principales son: Dolor, enrojecimiento y edema en el sitio de aplicación, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre y náuseas. Generalmente aparecen uno o dos días después de la aplicación de la vacuna.

¿Que hacer en caso de presentar efectos adversos?

En caso de síntomas o manifestaciones no descritas o agravamiento contacte a un médico o llame al 911 para recibir atención médica.



TOMADO Y ADAPTADO DE: GUÍA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA SPIKEVAX DE MODERNA, INC., CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 Y POLÍTICA RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19.